



## **NORME DA OSSERVARE DA PARTE DEL PAZIENTE PER LA PREPARAZIONE AD ESAMI TC CON MEZZO DI CONTRASTO**

Quando il paziente deve sottoporsi ad un esame RM che comporti la somministrazione di mezzo di contrasto (chelato del gadolinio) per via endovenosa, deve preventivamente osservare le seguenti norme:

**1. IL GIORNO STESSO DELL'ESAME**

Presentarsi digiuni da almeno 5 ore prima dell'esame, può bere acqua.

**2. PORTARE I SEGUENTI ESAMI:**

Creatininemia di massimo due mesi.

**3. PORTARE L'IMPEGNATIVA PER L'ESAME TC CON MDC E TUTTA LA DOCUMENTAZIONE CLINICA IN SUO POSSESSO**

**4. IN CASO DI ALLERGIE CONDIVIDERE IL DOCUMENTO ALLEGATO "Gestione del Paziente da sottoporre ad indagine con mdc" CON IL MEDICO PRESCRITTORE**

**5. HA GIÀ ESEGUITO ESAMI TC CON MDC?**

NO            SI            DOVE \_\_\_\_\_

**6. ATTENZIONE:** se i valori di eGFR sono inferiori a 30 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> al paziente non potrà essere somministrato il Mezzo di Contrasto.

**7. ATTENZIONE:** Se il paziente è diabetico ed assume Metormina, si raccomanda la sospensione del farmaco nelle 48 ore precedent l'esame ( previa consultazione del medico di famiglia ); la ripresa della terapia deve avvenire dopo 48 ore se la funzionalità renale risulta nella norma. Nelle 48 ore precedenti e successive all'esame si suggerisce comunque un'abbondante idratazione.